



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๓๒

ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๗/ ว ๑๐๗๕๗๖ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เข้มงวดมาตรการโรคล้มปี สกีนและโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมียในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

เรียน **ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด**

ด้วยในขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนและมีแนวโน้มพบรายงานการระบาดของโรคล้มปี สกีนและโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมียเพิ่มมากขึ้นจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงแมลงพาหะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจากการระบาดของโรคล้มปี สกีนและโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมียที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้แต่ละหน่วยงานเข้มงวดดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

๑.๑ แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนภัยเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ รวมถึงสหกรณ์โคนม ศูนย์รับนมในพื้นที่ถึงสถานการณ์การระบาดของโรคล้มปี สกีนและโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย มาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยเน้นให้เกษตรกรดำเนินการ

๑.๑.๑ สังเกตอาการ หากพบสัตว์ป่วยหรือสงสัยโรคระบาดสัตว์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันทีเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกรณีพบกระบือหรือโคป่วยตายสงสัยโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย ให้เร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเนื่องจากโรคนี้อาจมีความรุนแรง อัตราตายสูงและเกษตรกรมักได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก รวมทั้งเน้นย้ำเกษตรกร ห้ามฆ่าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ตายเพื่อบริโภคหรือจำหน่าย เนื่องจากพบว่าการฆ่าและซากสัตว์ไปบริโภคเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายโรค

๑.๑.๒ เข้มงวดการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น เช่น

๑.๑.๒.๑ งดให้บุคคลภายนอกเข้ามาในฟาร์มโดยเฉพาะพ่อค้ารับซื้อโค กระบือ เข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างเด็ดขาด หากจำเป็นต้องเปลี่ยนรองเท้าที่ใช้เฉพาะภายในฟาร์มและเดินผ่านอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้า

๑.๑.๒.๒ งดให้รถภายนอกเข้ามาในฟาร์มโดยเฉพาะรถขนส่งสัตว์ มูลสัตว์ และอาหารสัตว์ หากจำเป็น ให้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถทุกครั้งก่อนเข้าออกสถานที่เลี้ยงโค กระบือ

๑.๒ ดำเนินการทำลายเชื้อโรคที่จุดเสี่ยง ได้แก่ ตลาดนัดค้าสัตว์ แหล่งรวมสัตว์ คอกพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สหกรณ์โคนม ศูนย์รับนมนมดิบ เป็นต้น เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงพาหะ สำหรับโรคล้มปี สกีน

๑.๓ กรณีพบสัตว์แสดงอาการสงสัยโรคล้มปี สกีนและโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย ให้ปฏิบัติ ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางการดำเนินการ

๑.๓.๑ รายงานการเกิดโรคตามแบบกคร. ๑-๖ ในระบบ e-smart surveillance ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดโรค เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์ของโรคและวางแผนการควบคุมโรคที่เหมาะสม

๑.๓.๒ ทำบันทึกสิ่งกักสัตว์ป่วย สัตว์ร่วมฝูง ทั้งนี้หากมีปัญหาลาดแคลนอาหารสัตว์ ขณะกักสัตว์ให้ประสานสำนักงานปศุสัตว์เขตเพื่อขอการสนับสนุนอาหารสัตว์จากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่

๑.๓.๓ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อให้ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ตั้งจุดตรวจ ควบคุมการเคลื่อนย้ายเข้าออกรวมทั้งการทำลายเชื้อโรคในบริเวณรัศมี ๕ กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค

๑.๓.๔ รักษาสัตว์ป่วยโดยให้ค้ำจนถึงปริมาณยาปฏิชีวนะที่สัตว์ได้รับซึ่งควรให้ครบ โดสเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อจากรอยโรคที่หายช้า รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาสัตว์ป่วยดำเนินตามหลัก ความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัด สำหรับโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะให้คำนึงถึง ผลความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ (Drug sensitivity) ในพื้นที่

๑.๓.๕ กรณีพบกระปือหรือโคสงสัยโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย ให้เก็บตัวอย่างอวัยวะ เช่น ปอด ตับ ม้ามและหัวใจส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในพื้นที่ เพื่อทำการยืนยันผลและหา ความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ เพื่อจะได้ใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมในการรักษาสัตว์ป่วยร่วมฝูง ในกรณีสัตว์แสดง อาการป่วยแต่ไม่ตายและมีไขสูง ให้เก็บเลือด smear บนแผ่นสไลด์เพื่อส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

๑.๓.๖ การฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (Ring vaccination) มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม โรคให้อยู่ในวงจำกัด ซึ่งการกำหนดรัศมีที่จะฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า ๕ กิโลเมตรได้ โดยให้พิจารณาตามสถานการณ์การระบาดของโรคในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการจากพื้นที่ด้านนอกเข้ามาสู่ด้านใน

๑.๓.๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมสนับสนุนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในการวางแผน ควบคุมโรคทั้งการจัดชุดรักษาสัตว์ป่วยและการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค

๑.๓.๘ คั่นหาโรค โดยการจัดตั้งจุดรับแจ้งโรคภายในหมู่บ้านหรือตำบล หรืออาจใช้ เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งโรค การเฝ้าระวังโรคและควบคุมโรค เพื่อใช้ในการแจ้ง เตือนข่าวสารต่างๆ รวมทั้งข่าวด้านปศุสัตว์

๑.๓.๙ ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยการเกิดโรคล้มปี สกีนและโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย มาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทราบ

๒. สำนักงานปศุสัตว์เขต

๒.๑ กำกับดูแลการควบคุมโรคของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดโดยให้เป็นไป ตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนด

๒.๒ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เวชภัณฑ์ในการควบคุมโรคให้เพียงพอ หากไม่เพียงพอสามารถ ประสานขอการสนับสนุนได้ที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์


๓. กองสารวัตรและกักกัน

๓.๑ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เพื่อตั้งจุดตรวจควบคุมการเคลื่อนย้าย
กรณีที่มีการระบาดของโรค

๓.๒ สนับสนุนการดำเนินงานฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยง

๓.๓ จัดชุดเฉพาะกิจเข้าร่วมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายบุญฤกษ์ ปิ่นประสงค์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์